

#使わせニッポン!

made
in
Japan



50mL×1 本入り

リニューアル新発売

熱血価格 × 利便性向上

劇 動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

**フルニキシブ注
10%「リケン」**

非ステロイド系解熱 鎮痛 抗炎症剤

製造販売業者



リケンベッツファーマ株式会社
埼玉県入間郡越生町成瀬829-6

劇 動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

フルニキシ注 10%「リケン」

非ステロイド系解熱・鎮痛・抗炎症剤

【成分及び分量】本品1mL中
フルニキシメグルミン166.0mg
(フルニキシンとして100mg)

【効能又は効果】

牛：細菌性肺炎における解熱及び消炎、急性乳房炎における解熱
馬：運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和、痙攣時の鎮痛

【用法及び用量】

牛：1日1回体重1kg当たりフルニキシンとして2mgを静脈内に1~3日間投与する。
馬：1日1回体重1kg当たりフルニキシンとして1.0mgを静脈内に投与する。

【貯法】室温保存、密封容器

【包装】50mL、注射剤用ガラス容器



3つの「安」をお届けします

安心

安全

安定供給

投薬早見表

	動物の体重					
	50kg	100kg	300kg	500kg	600kg	700kg
フルニキシ注5%	2mL	4mL	12mL	20mL	24mL	28mL
フルニキシ注10%	1mL	2mL	6mL	10mL	12mL	14mL

動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

動物用懸濁水性 プロカインペニシリンG



動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

マイシリン・ゾル 「タムラ」



動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

アンピシリンゾル 20% 注



動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

プレドニゾロン注射液

